

AERO-RED[®] 40mg

Comprimidos masticables
Simeticona

COMPOSICIÓN por comprimido masticable:

Simeticona 40 mg

Excipientes: Sacarosa, Sílice coloidal.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Comprimidos masticables: envases de 30 y 100 comprimidos masticables.

ACTIVIDAD:

AERO-RED es una silicona antiespumante, que destruye las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

TITULAR:

URIACH-AQUILEA OTC S.L.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:

J. URIACH Y CÍA, S.A.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

INDICACIONES:

Alivio sintomático de los gases (Aerofagia y meteorismo), con todas sus manifestaciones. Facilita el eructo.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a la simeticona o dimeticona.

PRECAUCIONES:

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.
No exceder la dosis indicada.

INTERACCIONES:

No se han descrito.

ADVERTENCIAS:

• Embarazo y Lactancia

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños

Consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGIA:

Comprimidos masticables. Dos comprimidos masticables o más después de cada comida; no excediéndose la dosis de 10 comprimidos masticables por día. Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos (no deben tragarse enteros).

SOBREDOSIFICACION Y SU TRATAMIENTO:

Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental consulte a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS:

Eructos. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

CONSERVACION:

No guardar en el cuarto de baño o en los lugares de elevada humedad.

TEXTO REVISADO:

Octubre 1994.

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

URIACH-AQUILEA OTC

Av. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
