

COMPOSICIÓN:

Para 1 ml (20 gotas) simeticona 100 mg; sacarosa; y otros excipientes: propilenglicol, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, esencia de fresa, colorante rojo (E 123), hidróxido de sodio y agua purificada.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE:

Envases de 25 ml y 100 ml de gotas orales en solución.

ACTIVIDAD:

AERO-RED es una silicona antiespumante, que destruye las burbujas de gas, facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasiona.

TITULAR:

URIACH-AQUILEA OTC S.L.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN:

J. URIACH Y CÍA, S.A.; Av. Camí Reial, 51-57, 08184-Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

INDICACIONES:

Alivio sintomático de los gases (Aerofagia y meteorismo), con todas sus manifestaciones. Facilita el eructo.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a la simeticona o dimeticona.

PRECAUCIONES:

En caso de agravación o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

No exceder la dosis indicada.

INTERACCIONES:

No se han descrito.

ADVERTENCIAS:

• **Embarazo y Lactancia**

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Uso en niños

Consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGIA:

Lactantes y niños, siempre bajo consejo médico: 4 gotas en el biberón o con otro alimento o líquido, pueden administrarse tres o cuatro veces al día.

Adultos: tome 20 gotas tres o cuatro veces al día.

AERO-RED gotas tiene sabor a fresa y puede administrarse solo o diluido en cualquier líquido.

Agítese antes de usarlo.

Para su utilización, córtese la punta del dosificador.

SOBREDOSIFICACION Y SU TRATAMIENTO:

Aunque no es de esperar fenómenos de intoxicación, en caso de ingestión accidental consulte a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS:

Eructos. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD:

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

CONSERVACION:

No guardar en el cuarto de baño o en los lugares de elevada humedad.

TEXTO REVISADO:

Octubre 1994.

SIN RECETA MEDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA
DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

URIACH-AQUILEA OTC

Av. Camí Reial, 51-57

08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
